Visualisierung: 2D Vektorfelder II

Andreas Kolb und Martin Lambers

computergraphik und multimedia systeme
universität siegen

Letzte Stunde: div und rot

2

- Betrachte ein infinitesimal kleines Flächenstück S

Divergenz:

$$\operatorname{div} \vec{v}(\vec{x}) = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y}$$

- „Quelle“ oder „Senke“?
- „Auseinanderströmen“

Totales Differenzial:

$$J_{\vec{v}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial v_x}{\partial x} & \frac{\partial v_x}{\partial y} \\ \frac{\partial v_y}{\partial x} & \frac{\partial v_y}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Letzte Stunde: div und rot

3

- Betrachte ein infinitesimal kleines Flächenstück S

Rotation:

$$\operatorname{rot} \vec{v}(\vec{x}) = \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y}$$

Totales Differenzial:

$$J_{\vec{v}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial v_x}{\partial x} & \frac{\partial v_x}{\partial y} \\ \frac{\partial v_y}{\partial x} & \frac{\partial v_y}{\partial y} \end{pmatrix}$$

- „Lokale Rotation“
- „Verwirbelung“

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Eigenwerte einer Matrix

4

Als Eigenwert einer $n \times n$ -Matrix $\mathbf{A}$ bezeichnet man Skalarwerte λ , die die Gleichung

$$\mathbf{A}\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

erfüllen.

Diese Gleichung ist für bestimmte Paare von Eigenwerten λ und Eigenvektoren $\vec{x}$ erfüllt.

$$\mathbf{A}\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{Id})\vec{x} = \vec{0}$$

charakteristisches
Polynom

$$\text{lösbar für } \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{Id}) = 0$$

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Vektorfeld-Topologie

5

	Quellen	Senken	unerreichbare Fixpunkte	Sattelpunkt
1				
2				
3				
4				
5				

Visualisierung

Andreas Kolb, Martin Lambers

Eigenvektoren

6

● Welche Rolle spielen die **reellen Eigenvektoren**?
(komplexe Eigenvektoren sollen hier nicht betrachtet werden)

Bei den Beispielmatrizen waren die Eigenvektoren die Einheitsvektoren der Koordinatenachsen

Bei beliebigen Jacobimatrizen bestimmen die Eigenvektoren die Scherung der Koordinatenachsen

Visualisierung

Andreas Kolb, Martin Lambers

Stabilität

7

Stabilität bzw Instabilität wird durch den **Realteil der Eigenwerte** bestimmt:

- Ein lineares System ist (asymptotisch) stabil, wenn für alle Eigenwerte gilt:
 $Re\lambda_k \leq 0$
- Ein lineares System ist instabil, wenn für mindestens einen Eigenwert gilt:
 $Re\lambda_k > 0$

Anmerkung: Asymptisch stabil heißt, dass es **unendlich viele** Pfade zu dem Fixpunkt gibt. Bei stabilen Systemen sind es **abzählbar viele**.

Visualisierung

Andreas Kolb, Martin Lambers

Stabilität

8

Im kritischen Punkt ist die Strömung gleich null.
Beginne ich die Berechnung einer Partikelbahn in der Nähe eines kritischen Punkts führt mich die Strömung...

stabil	instabil	asympt. stabil
„...immer direkt in die Umgebung Fixpunkts“	„...immer aus der Umgebung des Fixpunkts heraus“	„...immer zu dem Fixpunkt hin, aber evtl. auf Umwegen“
„Der Fehler wird geringer bzw. bleibt konstant“	„Der Fehler wird größer“	„Der Fehler wird irgendwann stabil“

Visualisierung

Andreas Kolb, Martin Lambers

Feldlinien

9

- Wie bestimme ich Feldlinien (Strömungslinien) im allgemeinen Fall?
- Wir suchen die **Bahn eines Partikels**, d.h. seine Position in Abhängigkeit der Zeit.

$$\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

- Diese Bahn muß so bestimmt werden, dass sie in jedem Punkt tangential zu dem gegebenen Vektorfeld verläuft

Das Vektorfeld selbst sei zeitlich konstant (statisch)

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Explizites Euler-Verfahren

10

- Gegeben sei ein statisches Vektorfeld $\vec{v}(\vec{x})$ und ein Startpunkt $\vec{x}_0 = \vec{x}(t_0)$.
- Gesucht ist die Partikelbahn $\vec{x}(t)$

- Taylorentwicklung:**

$$\vec{x}(t_0 + \tau) = \vec{x}(t_0) + \tau \frac{\partial \vec{x}}{\partial t}(t_0) + \dots$$

$$\vec{x}(t_0 + \tau) = \vec{x}_0 + \tau \vec{v}(x_0) + \dots$$

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Explizites Euler-Verfahren

11

- Gegeben sei ein statisches Vektorfeld $\vec{v}(\vec{x})$ und ein Startpunkt $\vec{x}_0 = \vec{x}(t_0)$.
- Gesucht ist die Partikelbahn $\vec{x}(t)$

- Taylorentwicklung:**

$$\vec{x}(t_0 + \tau) = \vec{x}(t_0) + \tau \frac{\partial \vec{x}}{\partial t}(t_0) + \dots$$

$$\vec{x}(t_0 + \tau) = \vec{x}_0 + \tau \vec{v}(x_0) + \dots$$

$$\vec{x}_{i+1} \approx \vec{x}_i + \tau \vec{v}(x_i)$$

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Explizites Euler-Verfahren

12

$$\vec{x}_{i+1} \approx \vec{x}_i + \tau \vec{v}(x_i)$$

- Beginne an einem bestimmten Startpunkt $\vec{x}_0$
- Bestimme die Strömung $\vec{v}(\vec{x}_0)$ an diesem Punkt.
- Gehe einen kleinen Schritt in Richtung der Strömung

- Genauigkeit** ist abhängig von der Schrittweite τ .
- Warum „explizit“?** Der Wert x_{i+1} ist **explizit gegeben**, da alle Terme aus der rechten Seite bekannt sind.

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Explizites Euler-Verfahren

13

● **Beispiel:** Zirkulares Vektorfeld $\vec{v}(x, y) = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$

Das explizite Euler-Verfahren liefert hier eine Spirale!

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Explizites Euler-Verfahren

14

Das explizite Euler Verfahren wird bei zu großer Schrittweite **numerisch instabil**. (Ein Beispiel dazu kommt in der Übung)

Beispiel: $\frac{dx}{dt} = -kx$ Lösung: $x(t) = e^{-kt}$ stabil für: $k\tau \leq 2$

Schrittweite klein genug

zu große Schrittweite (instabil)

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Implizites Euler-Verfahren

15

● **Taylorentwicklung im Punkt $\vec{x}(t_0 + \tau)$ rückwärts:**

$$\vec{x}(t_0) = \vec{x}(t_0 + \tau) - \tau \frac{\partial \vec{x}}{\partial t}(t_0 + \tau) + \dots$$

auflösen nach $\vec{x}(t_0 + \tau)$:

$$\vec{x}(t_0 + \tau) = \vec{x}(t_0) + \tau \frac{\partial \vec{x}}{\partial t}(t_0 + \tau) + \dots$$

$$\vec{x}_{i+1} \approx \vec{x}_i + \tau \vec{v}(x_{i+1})$$

● implizit: $\vec{v}(x_{i+1})$ ist nicht von vorneherein bekannt.

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Implizites Euler-Verfahren

16

$$\vec{x}_{i+1} \approx \vec{x}_i + \tau \vec{v}(x_{i+1})$$

● Suche denjenigen Punkt $\vec{x}_1$, dessen Geschwindigkeitsvektor mit dem Vektor von $\vec{x}_0$ nach $\vec{x}_1$ übereinstimmt.

- **Vorteil:** numerische Stabilität
- **Nachteil:** Lösung der impliziten Gleichung kann sehr aufwändig sein (z.B. iterativer Ansatz)

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Implizites Euler-Verfahren

17

- Einfache Lösung im linearen Fall: $\vec{v}(\vec{x}) = \mathbf{A}\vec{x}$

$$\vec{x}_{i+1} = \vec{x}_i + \tau \mathbf{A} \vec{x}_{i+1}$$

$$\text{Id} \vec{x}_{i+1} - \tau \mathbf{A} \vec{x}_{i+1} = \vec{x}_i$$

$$\vec{x}_{i+1} = (\text{Id} - \tau \mathbf{A})^{-1} \vec{x}_i$$

Im linearen Fall ist also auch hier eine explizite Berechnung der Partikelbahn möglich.

- Im Allgemeinen ist die Lösung der impliziten Gleichung allerdings aufwändiger und erfordert iterative Verfahren.

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Implizites Euler-Verfahren

18

- Beispiel: Zirkulares Vektorfeld $\vec{v}(x,y) = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$

Das implizite Euler-Verfahren ist stabiler als das explizite, aber nicht genauer.

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Fehlerbetrachtung

19

- Wie groß ist der Fehler?

- Der **lokale Diskretisationsfehler** (lok. Abbruchfehler) d_i ist der Fehler, der bei einem einzigen Schritt gemacht wird.
 - Er entsteht beim Abbrechen der Taylorreihe.
- Der **globale Abbruchfehler** g_i ist der Fehler, der durch Akkumulation der lokalen Fehler entsteht.
 - Er ist in der Regel eine Größenordnung höher als der lok. Fehler
- Jedes num. Integrationsverfahren hat eine **Fehlerordnung**:

$$\text{Fehlerordnung } p: g_i = o(\tau^{p+1}), d_i = o(\tau^p)$$

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Euler-Verfahren

20

- Das **Euler-Verfahren** (explizit oder implizit) hat die Fehlerordnung 1.

explizit

implizit

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Prädiktor-Korrektor-Verfahren

21

Idee: Kombiniere das explizite mit dem impliziten Euler-Verfahren:

- Versuche zunächst den nächsten Punkt „vorherzusagen“ (Prädiktor) mit explizitem Euler Verfahren:

$$\vec{x}_{i+1}^{(P)} = \vec{x}_i + \tau \vec{v}(\vec{x}_i)$$

- Korrigiere diesen Wert durch einen impliziten Schritt:

$$\vec{x}_{i+1} = \vec{x}_i + \frac{\tau}{2} (\vec{v}(\vec{x}_i) + \vec{v}(\vec{x}_{i+1}^{(P)}))$$

Explizites Heun-Verfahren
2. Ordnung

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Heun'sches Verfahren

22

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Heun'sches Verfahren

23

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Fixpunkt-Iteration

24

Idee: Führe mehrere Prädiktor-Korrektor-Schritte hintereinander aus bis das Ergebnis konvergiert.

- Bestimme zunächst den nächsten Punkt als Vorhersage (Prädiktor) mit explizitem Euler Verfahren

$$\vec{x}_{i+1}^{(0)} = \vec{x}_i + \tau \vec{v}(\vec{x}_i)$$

- Korrigiere diesen Wert so lange, bis sich der Wert nicht mehr signifikant ändert.

$$\vec{x}_{i+1}^{(k+1)} = \vec{x}_i + \frac{\tau}{2} (\vec{v}(\vec{x}_i) + \vec{v}(\vec{x}_{i+1}^{(k)}))$$

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Runge-Kutta-Verfahren

25

- Klassisches Runge-Kutta-Verfahren (4. Ordnung)

$$\begin{aligned}\bar{k}_1 &= \vec{v}(\bar{x}_i) \\ \bar{k}_2 &= \vec{v}\left(\bar{x}_i + \frac{1}{2}\tau \bar{k}_1\right) \\ \bar{k}_3 &= \vec{v}\left(\bar{x}_i + \frac{1}{2}\tau \bar{k}_2\right) \\ \bar{k}_4 &= \vec{v}\left(\bar{x}_i + \tau \bar{k}_3\right) \\ \bar{x}_{i+1} &= \bar{x}_i + \frac{1}{6}\tau(\bar{k}_1 + 2\bar{k}_2 + 2\bar{k}_3 + \bar{k}_4)\end{aligned}$$

- Fehlerordnung 4

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Vergleich

26

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Zusammenfassung

27

DIFFERENTIALGLEICHUNGEN

- Wir haben das Vektorfeld $\vec{v} = f(\vec{x})$ betrachtet, z.B. $\vec{v}(\vec{x}) = \mathbf{A}\vec{x}$

$$\vec{v}(\vec{x}) = \frac{\partial \vec{x}}{\partial t} \quad \frac{\partial \vec{x}(t)}{\partial t} - \vec{v}(\vec{x}(t)) = 0$$

Gewöhnliche Differentialgleichung, 1. Ordnung

Mit einer Nebenbedingung $\vec{x}(t_0) = \vec{x}_0$ spricht man von einer **Anfangswertaufgabe** (bzw. Anfangswertproblem).

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Stabilität des Eulerverfahrens

28

- Beispiel (1-dimensional)

Differentialgleichung:

$$\frac{\partial x(t)}{\partial t} = -k \cdot x$$

Analytische Lösung:

$$x(t) = x_0 e^{-kt}$$

Numerische Lösung: Euler explizit

Numerische Lösung: Euler implizit

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Beispiel zur Stabilität

29

- Betrachte die Differentialgleichung

$$\frac{\partial x(t)}{\partial t} = v(x(t)) = -k x(t) \quad \text{mit } k > 0$$

- **Behauptung:** Die Lösung dieser Gleichung ist

$$x(t) = e^{-kt}$$

- **Prüfe:**

$$\frac{\partial x(t)}{\partial t} = -k e^{-kt} = -k x(t)$$

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Beispiel zur Stabilität

30

- Differentialgleichung

$$\frac{\partial x(t)}{\partial t} = -k x(t)$$

- Analytische Lösung:

$$x(t) = e^{-kt}$$

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Beispiel zur Stabilität

31

- Differentialgleichung

$$\frac{\partial x(t)}{\partial t} = -k x(t)$$

- Analytische Lösung:

$$x(t) = e^{-kt}$$

- Explizites Eulerverfahren: $x_{i+1} = x_i + \tau v(x_i)$

$$x_1 = x_0 - \tau k x_0$$

$$= (1 - \tau k) x_0$$

$$x_2 = x_1 - \tau k x_1$$

$$= (1 - \tau k) x_1 = (1 - \tau k)^2 x_0$$

$$x_n = x_{n-1} - \tau k x_{n-1} = (1 - \tau k)^n x_0$$

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Beispiel zur Stabilität

32

- Differentialgleichung

$$\frac{\partial x(t)}{\partial t} = -k x(t)$$

- Analytische Lösung:

$$x(t) = e^{-kt}$$

- Explizites Eulerverfahren: $x_{i+1} = x_i + \tau v(x_i)$

$$x_n = (1 - \tau k)^n x_0$$

- Vergleich mit analyt. Lösung:

Start: $x(0) = x_0 = 1$

Für großes n muß gelten: $x_n \rightarrow 0$

Dazu muß gelten:

$$\|1 - \tau k\| < 1$$

Andreas Kolb, Martin Lambers

Visualisierung

Beispiel zur Stabilität

33

- Differentialgleichung

$$\frac{\partial x(t)}{\partial t} = -k x(t)$$

- Analytische Lösung:

$$x(t) = e^{-kt}$$

- Explizites Eulerverfahren: $x_{i+1} = x_i + \tau v(x_i)$

$$x_n = (1 - \tau k)^n x_0$$

- Vergleich mit analyt. Lösung:

Start: $x(0) = x_0 = 1$

Für großes n muß gelten: $x_n \rightarrow 0$

Dazu muß gelten:

$$-2 < -\tau k < 0$$

$$0 \leq \tau \leq \frac{2}{k}$$

Visualisierung

Andreas Kolb, Martin Lambers

Beispiel zur Stabilität

34

- Differentialgleichung

$$\frac{\partial x(t)}{\partial t} = -k x(t)$$

- Analytische Lösung:

$$x(t) = e^{-kt}$$

- Explizites Eulerverfahren: $x_{i+1} = x_i + \tau v(x_i)$

$$x_n = (1 - \tau k)^n x_0$$

- Vergleich mit analyt. Lösung:

Start: $x(0) = x_0 = 1$

Für großes n muß gelten: $x_n \rightarrow 0$

Dazu muß gelten:

$$-2 < -\tau k < 0$$

$$0 \leq \tau \leq \frac{2}{k}$$

Visualisierung

Andreas Kolb, Martin Lambers

Beispiel zur Stabilität

35

- Differentialgleichung

$$\frac{\partial x(t)}{\partial t} = -k x(t)$$

- Analytische Lösung:

$$x(t) = e^{-kt}$$

- Implizites Eulerverfahren: $x_{i+1} = x_i + \tau v(x_{i+1})$

$$x_1(1 + \tau k) = x_0$$

$$x_1 = \frac{1}{(1 + \tau k)} x_0$$

$$x_2 = \frac{1}{(1 + \tau k)} x_1 = \left(\frac{1}{(1 + \tau k)} \right)^2 x_0$$

$$x_n = \frac{1}{(1 + \tau k)} x_{n-1} = \left(\frac{1}{(1 + \tau k)} \right)^n x_0$$

Visualisierung

Andreas Kolb, Martin Lambers

Beispiel zur Stabilität

36

- Differentialgleichung

$$\frac{\partial x(t)}{\partial t} = -k x(t)$$

- Analytische Lösung:

$$x(t) = e^{-kt}$$

- Implizites Eulerverfahren: $x_{i+1} = x_i + \tau v(x_{i+1})$

$$x_n = \left(\frac{1}{(1 + \tau k)} \right)^n x_0$$

- Vergleich mit analyt. Lösung:

Start: $x(0) = x_0 = 1$

Für großes n muß gelten: $x_n \rightarrow 0$

Dazu muß gelten:

$$\left\| \frac{1}{1 + \tau k} \right\| < 1$$

erfüllt für alle $\tau > 0$

Visualisierung

Andreas Kolb, Martin Lambers

Fazit

37

Integrationsverfahren für gewöhnliche DGL.

Explizite Verfahren

- einfach zu berechnen
- numerisch *instabil* bei großen Schrittweiten

Implizite Verfahren

- i.A. aufwändig zu lösen
- numerisch *stabil*

Euler:

- sehr einfach,
- ungenau

Heun:

- einfach,
- gut für kleine Schrittweiten

Runge-Kutta:

- aufwändiger,
- gut auch bei rel. großen Schritten